



ALCEDO NA PADLÍ TORNÁDO

- ▶ Výborný poměr kvalita - cena
- ▶ Jeden z posledních azolů na trhu
- ▶ Dobrý ekotoxikologický profil
- ▶ Preventivní a kurativní účinnost
- ▶ Flexibilní použití - samostatně nebo v kombinacích, v různých růstových fázích
- ▶ Rychlý účinek - proniká do rostliny během 2-4 hodin
- ▶ Výborná účinnost na černou hnilobu

Detaily produktu

Účinná látka

tetraconazol 100 g/l

Formulace

emulgovatelný koncentrát (EC)

Přípravek je povolený k použití pouze profesionálními uživateli.

ALCEDO® je širokospektrální fungicid ze skupiny triazolů so systémovým účinkem, který působí proti padlí a strupovitosti na jabloních a padlí na révě. Může být aplikovaný v různých růstových fázích. Tetraconazole jako i ostatní triazoly patří do skupiny SBI inhibitorů biosyntézy sterolů, které v patogenech inhibují metabolismus tvorby sterolů hub blokováním reakce demytelace lanosterolu. Tetraconazole nemá vliv na tvorbu gibberelinů ani jiných rostlinných sterolů a proto nezpůsobuje na ošetřovaných rostlinách příznaky fytotoxicity.



Plodina – oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Termín aplikace
réva	padlí révová	0,125 l/ha 0,250 l/ha	30	do BBCH 61 od BBCH 61
jabloň	padlí jabloňové, strupovitost jabloňová	0,250 l/ha 0,300 l/ha	14	+ 2,1 kg Captan 80 WG

Doporučení pro aplikaci :

Réva:

- doba účinnosti se v závislosti od infekčního tlaku pohybuje na úrovni 7-14 dní
- ideální je preventivní termín aplikace a při vysokém tlaku se doba aplikace zkracuje na 7 dní
- pro zabránění vzniku rezistence je nutné střídání jednotlivých skupin účinných látek
- preventivní aplikace: Alcedo 0,125-0,250 l/ha
- preventivní aplikace při vysokém infekčním tlaku: Alcedo 0,125-0,250 l/ha + síra
- eradikativní (léčebná) aplikace: Alcedo 0,125-0,250 l/ha + Karathane New
- vysoká vedlejší účinnost na černou skvrnitost

Jabloně:

- preventivně padlí jabloňové – aplikace 0,250 l/ha v 7-14 denních intervalech. První ošetření 1-2 týdne před květem. Ošetřuje se do července. Maximální počet aplikací v plodině 2x.
- preventivně strupovitost jabloní – ošetřuje se od hrozby primární infekce, následně v 10 denních intervalech.
- při vyšším infekčním tlaku, kurativním, eradikativním použití – možnost kombinace s účinnými látkami mancozeb, pyrimethanil, dodine a captan

