



# První pomoc

## Co je nutné podniknout při zasažení koncentrátem přípravku **TM BISTERIL**?

### 1. Při zasažení očí:

- Okamžitě vypláchnout velkým množstvím pitné vody
- V případě přetrvávajícího podráždění oční sliznice je nutné vyhledat okamžitou lékařskou první pomoc
- Sebou vezměte etiketu nebo bezpečnostní list přípravku

### 2. Při požití:

- Nepřivodit zvracení, ihned povolát lékařskou pomoc
- Vyplachovat ústa a bohatě zapíjet vodou
- Okamžitě vyhledat rychlou lékařskou pomoc**
- Sebou vezměte etiketu nebo bezpečnostní list přípravku

### 3. Při zasažení kůže:

- Okamžitě opláchnout velkým množstvím pitné vody.
- V případě přetrvávajícího podráždění pokožky je nutné vyhledat okamžitou lékařskou první pomoc
- S sebou vezměte etiketu nebo bezpečnostní list výrobku

### 4. Při potřísnění oděvu:

- Okamžitě odstraňte (svlékněte) zasažený oděv .
- V případě zasažení kůže je nutné postupovat stejně jako v bodě 3.

155  a 112  → záchranná služba

+420.603 475 920  → **SANITACE, s.r.o.** → Michal Vostřel

♦ R – věty:	R 34	Způsobuje poleptání
♦ S – věty:	S 1/2	Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí
	S 3	Uchovávejte v chladnu
	S 28	Při kontaktu s pokožkou omýt vodou
	S 36/39	Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít
	S 45	V případě nehody či nevolnosti ihned vyhledat lékaře