



První pomoc

Co je nutné podniknout při zasažení koncentrátem přípravku **TM TARTAREX**?

1. Při zasažení očí:

- Okamžitě vypláchnout velkým množstvím pitné vody a neutralizovat opakovaným vyplachováním borovou vodou.
- V případě přetrvávajícího podráždění oční sliznice je nutné vyhledat okamžitou lékařskou první pomoc
- Sebou vezměte etiketu nebo bezpečnostní list přípravku

2. Při požití:

- Nepřivodit zvracení, ihned povolat lékařskou pomoc
- Vyplachovat ústa a bohatě zapíjet vodou
- Okamžitě vyhledat rychlou lékařskou pomoc**
- Sebou vezměte etiketu nebo bezpečnostní list přípravku

3. Při zasažení kůže:

- Okamžitě opláchnout velkým množstvím pitné vody.
- Proveďte neutralizaci postiženého místa citrónovou šťávou nebo octem
- V případě přetrvávajícího podráždění pokožky je nutné vyhledat okamžitou lékařskou první pomoc
- Sebou vezměte etiketu nebo bezpečnostní list výrobku

4. Při potřísnění oděvu:

- Okamžitě odstraňte (svlékněte) zasažený oděv .
- V případě zasažení kůže je nutné postupovat stejně jako v bodě 3.

Kontakty:

155  a 112  → záchraná služba

+420.603 475 920  → **SANITACE, s.r.o.** → Michal Vostřel

♦ **R – věty:** R 35 Způsobuje těžké poleptání

♦ **S – věty:** S 26 Při kontaktu s očima okamžitě vypláchnout vodou a vyhledat lékaře
S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít
S 45 V případě nehody či nevolnosti ihned vyhledat lékaře