

POPIS VÝROBKU

Vitamon[®] CE kompenzuje ztrátu vnitřní plochy způsobenou silným odkalením moštu.

Dodatečně Vitamon[®] CE vyrovnává ztrátu minerálních látek a vitamínů. Podíl celulózy zabrání dalšímu zastavení kvašení kvůli malému povrchu. Zvětšení vnitřní plochy podílem celulózy prospívá kvasinkám, katalyzuje látkovou výměnu. Vážnoucímu kvašení nebo zastavení se zabrání a podpoří se jistý kvasný průběh.

Vysoce efektivní kombinovaný přípravek se skládá z diamonium fosfátu, vitamínu B₁ plus upraveného podílu kvasinek a podílu buněk a celulózy, které stimulují kvasinky. Tím se zvýší nabídka volného asimilovatelného dusíku, který podporuje množení a rozsáhle adsorbuje substance zpomalující kvašení.

Povolený podle současných platných zákonů a nařízení EU. Testován odbornou laboratoří na čistotu a kvalitu.

CÍL OŠETŘENÍ

Podpora kvasinek pro bezporuchové prokvašení bez zbytkového cukru a pro čisté tóny silně odkalených moštů způsobené např.:

• flotací	• silnou sedimentací
• odstředěním	• ostrou filtrací moštu

**Kompenzace výživy
u silně vyčiřených
moštů**

PRODUKT A ÚČINEK

Vitamon[®] CE je úspěšná novinka k prevenci zastavení kvašení z důvodu silného odkalení moštů. Aplikací Vitamonu[®] CE se zvýší asimilovatelný dusík pro kvasinkové buňky a podpoří se schopnost jejich množení. Také budou sníženy jak substance rušící kvašení zbytky postřiků a mastné kyseliny, tak také bude stimulován výkon kvasinek. Zejména celulóza způsobí jemným rozptýlením zvýšení vnitřního povrchu a nabízí ve spojení s kvasinkami dodatečný katalytický potenciál. Také se redukuje sklon k sirce. Mimo to se dodatečně uspoří i SO₂. Vitamon[®] CE během skladování nevytváří hrudky.

DÁVKOVÁNÍ

Díky složení Vitamonu[®] CE je zákonem stanovena maximální povolená dávka 60 g/100 l. Pro optimální zásobení moštu se povolená maximální dávka 60 g/ 100 l přidá pokud možno před začátkem kvašení. Podle průběhu kvašení, zásoby živin nebo u stresované suroviny, lze doplňkově dávkovat do 1. třetiny kvašení 30 – 50 g/100 l Vitamonu[®] A. Doporučujeme zásobu živin v moštu prověřit jednoduchým testem na kvasinkami využitelný dusík z Erbslöh EasyLab.

Přípravek	Typ výživy	Doporučená dávka	Dodatečná dávka
Vitamon [®] CE	Základní zásobení a zvětšení vnitřní plochy pro silně odkalené mošty (např. flotací)	Ze zákona max. 60 g/100 l	30 – 50 g/100 l Vitamon [®] A

POUŽITÍ

Vitamon[®] CE rozpustit buď v moštu nebo ve vodě a přidat do moštu. Dbejte na dobré rozptýlení. Celkovou dávku je možné také rozdělit, první polovinu před začátkem kvašení a druhou polovinu během první třetiny kvašení.

SKLADOVÁNÍ

Skladovat v suchu a chránit před světlem. Otevřená balení ihned těsně uzavřít.